

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE,

EURE,

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

18 AVRIL 1967

BULLETIN N° 79

Supplément n°1

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

CULTURES FRUITIERES

Le nombre des périthèces mûrs est important. La végétation s'est fortement accrue depuis le dernier bulletin. Un nouveau traitement doit donc être appliqué dès réception de cet avis.

ENNEMIS DE PRINTEMPS

- ACARIENS : Début d'éclosion de *P. ulmi* (Araignée rouge) en vergers de plaine. Attendre une augmentation de la population pour intervenir.
- PUCERONS - PSYLLES : Activité importante localement.
- HOPLOCAMPE du POMMIER : Le traitement doit intervenir aux 3/4 de la chute des pétales. Il ne se justifie que dans les vergers attaqués l'année dernière. Utiliser l'un des produits conseillés contre l'Hoplocampe du poirier.
- MONILIA du CERISIER : Effectuer un nouveau traitement à la chute des pétales.

CULTURES LEGUMIERES

- MOUCHE de L'ASPERGE : Dans les jeunes cultures non encore en production, appliquer un traitement sur les pousses dès leur sortie du sol.
- SITONE du POIS : Un traitement ne doit intervenir que si la population est élevée. Utiliser : D.D.T., Lindane.

C O L Z A

GRANDES CULTURES

- MELIGETHES : Activité importante depuis la fin de la 1ère quinzaine d'avril, principalement en bordure des champs. De nombreuses cultures sont au stade de début de floraison ou proche de la floraison. Comme les dégâts de Meligèthes ne sont pratiquement plus à craindre à partir de l'ouverture des premières fleurs, une surveillance ne s'impose plus que dans les cultures les plus tardives, qui devront être traitées si le relèvement de la température favorise l'activité de l'insecte. Dans les cultures étendues on peut limiter le traitement aux bordures.
- CHARANCON DES SILIQUES : Premiers adultes.

RAPPELS: Hoplocampes du poirier et du prunier. Chenilles défoliatrices. Oïdium du pommier.

ERRATUM: Dans la note sur le traitement du sol (Bulletin n°77 du 20-2-1967) lire :
D B (dibrométhane) à 150 kg. de m.a. à l'hectare, au lieu de :
D B (dibrométhane) à 150 L. de m.a. à l'hectare.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer - 93 - Montreuil-sous-Bois.

7 153